

## **УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Интравагинальное УЗИ органов малого таза**

- Исследование проводится на пустой мочевой пузырь.
- При себе иметь полотенце или большую пеленку.

### **Гинекологическое УЗИ**

Исследование проводится на полный мочевой пузырь. Подготовка: За 1 - 1,5 часа до исследования выпить литр - полтора жидкости. При себе иметь полотенце или большую пеленку.

### **УЗИ мочевого пузыря**

Исследование проводится при полном мочевом пузыре (за 1-1.5 часа до исследования нужно выпить 1-1.5 л. жидкости). При себе иметь полотенце или большую пеленку.

### **Ректальное исследование органов малого таза**

Накануне вечером проводится очистительная клизма. Утром за 2 часа до исследования проводится повторная очистительная клизма. Мочевой пузырь для ректального исследования не наполняется. При себе иметь полотенце или большую пеленку.

### **УЗИ в акушерстве: Эхокардиография с доплерографией плода:**

Подготовка не требуется. При себе иметь полотенце или большую пеленку.

### **УЗИ брюшной полости, УЗИ печени и желчного пузыря, УЗИ поджелудочной железы, УЗИ селезенки, УЗИ абдоминальное (печень + поджелудочная железа + селезенка)**

Исследование проводится натощак или не ранее чем через 6-8 часов после легкого завтрака. При повышенном газообразовании применяется Эспумизан согласно схеме, также исключается прием продуктов, вызывающих повышенное газообразование - молочные продукты, черный хлеб, горох, фасоль, капуста, свежие овощи, фрукты и сладкие блюда. При себе иметь полотенце или большую пеленку.